



BRINTELLIX – ETT ANTIDEPRESSIVT LÄKEMEDEL

-  Brintellix är ett antidepressivum med multimodal verkningsmekanism för behandling av egentlig depression hos vuxna.^{1,2}
-  Brintellix har effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS).¹
-  Brintellix är även effektivt på kognitiva symtom vid depression samt förbättrar den funktionella kapaciteten vid depression.^{1,6-7}
-  Brintellix är vältolererat.^{1,3-5}
-  Brintellix startdos för patienter mellan 18-65 år är 10 mg en gång dagligen.¹
-  Brintellix subventioneras för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen.

10mg

Brintellix® (vortioxetin) Rx, F, ATC-kod: N06AX26, ▼ Detta läkemedel är föremål för ökad övervakning. **Indikation:** Behandling av egentlig depression hos vuxna. **Dosering:** Startdosen för Brintellix® är 10 mg vortioxetin en gång dagligen till vuxna under 65 år. Beroende på patientens individuella svar kan dosen ökas till maximalt 20 mg vortioxetin en gång dagligen eller minskas till minst 5 mg vortioxetin en gång dagligen. Den lägsta effektiva dosen om 5 mg en gång dagligen ska alltid användas som startdos hos patienter ≥ 65 år och kan ökas till maximalt 10 mg en gång dagligen. **Förpackningar:** Brintellix® finns som 5, 10, 15 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 och 98 st. **Subvention:** Brintellix subventioneras för patienter som provat men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé från januari 2017. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se. SE-BRIN-2017.02-00009566

Referenser

1. Produktresumé Brintellix, FASS.se. 2. Bang-Andersen Betal. J Med Chem. 2011;54(9):3206-3221. 3. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012;15(15):589-600. 4. Baldwin D Setal. Eur Neuropsychopharmacol. 2012;22(7):482-491. 5. Boulenger J Petal. J Psychopharmacol. 2012;26(11):1408-1416. 6. McIntyre R Setal. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17:1557-1567. 7. Mahabeshwarkar A et al. (2015) Neuropsychopharmacology doi:10.1038/npp.2015.52.